

Matokeo ya utafiti wa Afya ya uzazi uliofanyika Kigoma, Tanzania mwaka 2014 na 2016

Kati ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49


ACCESSIBLE VERSION: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/publications/surveys/africa/kigoma-tanzania/2016-infographic.htm>

Jumla ya viwango vya uzazi

Idadi ya watoto kwa kila mwanamke mmoja



+ .5




MABADILIKO NDANI YA MIAKA 2 (kutoka 2014 hadi 2016)

-2.9%

Shauku ya kuwa na watoto zaidi kati ya wanawake walio olewa

kati ya wanawake walio olewa



-7.3%


-27%

+16%

+35%

Matumizi ya uzazi wa mpango kati ya wanawake walio olewa

kati ya wanawake walio olewa



+21%

-3.4%

+167%

+11%

+46%

-4.7%

Mahudhurio katika hudu-ma ya mama mjamzito kabla ya kujifungua

Kwa wanawake wenye uzao tangu January 2014




Asilimia ya waliohudhuria angalau mahudhurio manne (4) katika klinik ya wajawazito kabla ya kujifungua, kwa uzao wa hivi karibuni.



+2.4%



Asilimia ya walioelezwa kuhusu matatizo yanayotokana na ujauzito, miongoni mwa wajawazito waliohudumiwa katika klinik ya wajawazito kabla ya kujifugua.





+12%

Malengo kama yalivyoainishwa na shirika la afya duniani.

Matokeo ya utafiti wa Afya ya uzazi uliofanyika Kigoma, Tanzania mwaka 2014 na 2016

Kati ya wanawake wenyewe umri wa miaka 15 hadi 49

<h2>Mahudhurio katika hudu-ma ya mama mjamzito kabla ya kujifungua</h2> <p>Kwa wanawake wenyewe uzao tangu January 2014</p>	<p>Asilimia ya walio pimwa shindikizo la damu, miongoni mwa wajawazito waliohudumiwa katika kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya walio pimwa shindikizo la damu</td> <td>5 1.1%</td> <td>46.0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asilimia ya waliopata huduma ya kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua kwa ujauzito ulio ndani ya miezi 3, katika uzao wa hivi karibuni.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya waliopata huduma ya kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua kwa ujauzito ulio ndani ya miezi 3</td> <td>17.0%</td> <td>15.6%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Malengo kama yalivyoainishwa na shirika la afya duniani.</i></p>		2014	2016	LENGO	Asilimia ya walio pimwa shindikizo la damu	5 1.1%	46.0%	100%		2014	2016	LENGO	Asilimia ya waliopata huduma ya kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua kwa ujauzito ulio ndani ya miezi 3	17.0%	15.6%	100%	MABADILIKO NDANI YA MIAKA 2 (kutoka 2014 hadi 2016)  
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya walio pimwa shindikizo la damu	5 1.1%	46.0%	100%															
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya waliopata huduma ya kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua kwa ujauzito ulio ndani ya miezi 3	17.0%	15.6%	100%															
<h2>Mahali pa kujifungulia</h2>	<p>Asilimia ya wanaojifungulia katika vituo vya afya.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya wanaojifungulia katika vituo vya afya</td> <td>47.0%</td> <td>58.6%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2016	LENGO	Asilimia ya wanaojifungulia katika vituo vya afya	47.0%	58.6%	100%									
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya wanaojifungulia katika vituo vya afya	47.0%	58.6%	100%															
<h2>Huduma za uchunguzi baada ya kujifungua</h2>	<p>Asilimia ya watoto wachanga waliofanyiwa uchunguzi ndani ya miezi 2</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya watoto wachanga waliofanyiwa uchunguzi ndani ya miezi 2</td> <td>85.6%</td> <td>79.9%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asilimia ya kina mama waliofanyiwa uchunguzi ndani ya wiki 6.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya kina mama waliofanyiwa uchunguzi ndani ya wiki 6</td> <td>12.5%</td> <td>17.2%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Malengo kama yalivyoainishwa na shirika la afya duniani.</i></p>		2014	2016	LENGO	Asilimia ya watoto wachanga waliofanyiwa uchunguzi ndani ya miezi 2	85.6%	79.9%	100%		2014	2016	LENGO	Asilimia ya kina mama waliofanyiwa uchunguzi ndani ya wiki 6	12.5%	17.2%	100%	 
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya watoto wachanga waliofanyiwa uchunguzi ndani ya miezi 2	85.6%	79.9%	100%															
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya kina mama waliofanyiwa uchunguzi ndani ya wiki 6	12.5%	17.2%	100%															
<h2>Kiwango cha akinamama waliojifungua kwa upasuaji.</h2>	<p>Asilimia ya waliojifungua Kigoma kwa njia ya upasuaji.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2016</th> <th>LENGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asilimia ya waliojifungua Kigoma kwa njia ya upasuaji</td> <td>3.5%</td> <td>5.1%</td> <td>5% ← → 15%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Shirika la Afya duniani linashauri kuwa asilimia 5-15 ya wanaojifungua wajifungue kwa njia ya upasuaji</i></p>		2014	2016	LENGO	Asilimia ya waliojifungua Kigoma kwa njia ya upasuaji	3.5%	5.1%	5% ← → 15%									
	2014	2016	LENGO															
Asilimia ya waliojifungua Kigoma kwa njia ya upasuaji	3.5%	5.1%	5% ← → 15%															

MAPENDEKEZO

Kuenea kwa njia za uzazi wa mpango kunaweza kuongezeka kwa:

- Kutoa mafunzo kwa watoa huduma za afya wengi zaidi juu ya kutoa ushauri kuhusu uzazi wa mpango pamoja na njia za uzazi wa mpango.
- Kutoa mafunzo kwa watoa huduma za afya wengi zaidi juu ya kutoa ushauri kuhusu uzazi wa mpango pamoja na njia za uzazi wa mpango.
- Kutoa mafunzo kwa watoa huduma za afya wengi zaidi juu ya kutoa ushauri kuhusu uzazi wa mpango pamoja na njia za uzazi wa mpango.

- Kutoa huduma za uzazi wa mpango sambamba na huduma nyingine za afya.
- Kuwapa wanawake taarifa za kutosha juu ya usalama na ufani ni wa njia za uzazi wa mpango.
- Kuwapa mafunzo watoa huduma za afya juu ya umuhimu wa kupima shindikizo la damu na kuwafahamisha wakinamama wajawazito juu ya dalili za hatari za matatizo yanayotokana na ujauzito.

Huduma za kliniki ya kina mama wajawazito kabla ya kujifungua zinaweza kuboreshwaa kwa:

- Kuwajulisha kinamama faida za kifaya za kuanza kliniki ya ujauzito kabla ya kujifungua hasa katika miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito.
- Kuwahamasisha wakina mama kuhuduria angalau mahudhurio manne ya kliniki wakati wa ujauzito.
- Kuwajulisha kinamama faida za kifaya za kuanza kliniki ya ujauzito kabla ya kujifungua.
- Kuwahamasisha wakina mama kuhuduria angalau mahudhurio manne ya kliniki wakati wa ujauzito.

Asilimia ya wanaojifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya inaweza kuongezeka kwa:

- Kutoa rufaa kwa wajawazito wenye matatizo kwenda katika ngazi za juu za vituo vya kutolea huduma za afya.
- Kuruhusu wajawazito kuwa na wasaidizi wakati wa uchungu na kujifungua.

Viwango vya huduma baada ya kujifungua vinaweza kuongezeka kama watoa huduma:

- Watasisitiza umuhimu wa uchunguzi baada ya kujifungua kwa mama na mtoto wakati wa kliniki ya wajawazito kabla ya kujifungua.
- Kuwafanya wanawake uchunguzi baada ya kujifungua wakati wanapo waleta watoto wao kwaajili ya uchunguzi.

<https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/index.htm>



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion